

BRONCODILATADORES:

1. BETA 2 AGONISTA:

1.1. CURTA DURAÇÃO:

1.1.1. SALBUTAMOL (AEROLIN)

1.1.2. FENOTEROL (BEROTEC)

1.2. LONGA DURAÇÃO:

1.2.1. SALMETEROL (SEREVENT)

1.2.2. FORMOTEROL (FLUIR, FORMOCAPS)

1.3. ULTRA LONGA DURAÇÃO:

1.3.1. INDACATEROL (ONBRIZE)

1.3.2. VILANTEROL (RELVAR – associação com fluticasona)

1.3.3. OLODATEROL (STRIVERDI)

2. ANTI-COLINÉRGICOS:

2.1. CURTA DURAÇÃO:

2.1.1. BROMETO DE IPATRÓPIO (ATROVENT)

2.2. LONGA DURAÇÃO:

2.2.1. BROMETO DE TIOTRÓPIO (SPIRIVA)

2.2.2. BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO (SEEBRI, ULTIBRO – associação com indacaterol)

2.2.3. BROMETO DE ACLIDÍNIO (BRETARIS)

CORTICÓIDES INALATÓRIOS:

1. BECLOMETASONA (CLENIL, FOSTAIR – associação com formoterol)

2. FLUTICASONA (SERETIDE – associação com salmeterol, RELVAR – associação com indacaterol)

3. BUDESONIDA (BUSONID, PULMICORT, FORASEQ – associação com formoterol, ALENIA – associação com formoterol, SYMBICORT – associação com formoterol)

4. MOMETASONA (OXIMAX)

5. CICLESONIDA (ALVESCO)