

CHECK LIST PARES CRANIANOS

AVALIADO: _____

AVALIADOR: _____

NOTA TOTAL: _____ (10,0)

OBSERVAÇÕES: _____

1. Identifica-se ao paciente (relação medico-paciente) (0,5) SIM() NÃO ()

NC I Olfatório: solicita substâncias voláteis para teste olfato e realiza avaliação corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC II Óptico: testa corretamente

Acuidade visual (tabela optótipos) (0,25) SIM() NÃO ()

Campo visual (0,50) SIM() NÃO ()

Fundoscopia (0,50) SIM() NÃO ()

Reflexos pupilares (0,50) SIM() NÃO ()

Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC III Oculomotor: testa corretamente

Motilidade ocular (0,50) SIM() NÃO ()

Reflexos pupilares consensual e fotomotor (0,50) SIM() NÃO ()

Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC IV Troclear: testa corretamente

Motilidade ocular (olha ponta do nariz) (0,50) SIM() NÃO ()

Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC V Trigêmeo: testa corretamente

- Sensibilidade face (0,25) SIM() NÃO ()
- Sensibilidade língua (0,25) SIM() NÃO ()
- Tônus/Força músculos mastigação (0,25) SIM() NÃO ()
- Reflexo córneo-pálpebral (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC VI Abducente: testa corretamente

- Motilidade ocular (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC VII Facial: testa corretamente

- Sensibilidade face posterior do canal auditivo externo (0,25) SIM() NÃO ()
- Gustação 2/3 anteriores língua – açúcar, sal (0,25) SIM() NÃO ()
- Músculos mímica facial (0,5) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC VIII Vestíbulo Coclear: testa corretamente

- Audição: Weber + Rinne (0,25) SIM() NÃO ()
- Equilíbrio (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC IX Glossofaríngeo: testa corretamente

- Gustação 1/3 posterior de língua (0,25) SIM() NÃO ()
- Sensibilidade Faringe e palato– reflexo vômito (NC X) (0,25) SIM() NÃO ()
- Motilidade músculo estilofaríngeo ; AHHHH (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC XI Acessório: testa corretamente

- Mobilidade músculo trapézio e esternocleidomastóideo (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

NC XII Acessório: testa corretamente

- Motilidade língua (0,25) SIM() NÃO ()
- Detecta possíveis alterações e as descreve corretamente (0,25) SIM() NÃO ()

AVALIAÇÃO OPCIONAL: (EXTRA QUANDO PERTINENTE COM CASO) (1,50)

- Descreve diagnósticos diferenciais(0,25) SIM() NÃO ()
- Solicita exames complementares qdo preciso e necessário (0,50) SIM() NÃO ()
- Localiza topograficamente (mesencéfalo, ponte e/ou bulbo) de acordo com alterações semiológicas (0,5) SIM() NÃO ()
- Conduta/ tratamento correto (0,25) SIM() NÃO ()